

SILOCHEM-GİS



Kirazda çatlamaya
SON

NOVICHEM
Plant Extracts



SİLOCHEM-GİS

Polyether-Polymethylsiloxane-Copolymer

Silisilik asit kutikula altında kalın silika tabakası oluşumu, çift katlı kutikula tabakası oluşumu, silisyum selüloz membranının kalınlaşması, papilla oluşumu, epidermal hücre duvarındaki organik bileşikler ile blok oluşumu şeklindeki fiziksel yapılar ile meyve çatlamalarını engellemektedir.

Silisyum yer kabuğunda yaklaşık % 28 karasal bitkilerde kuru ağırlık ilkesine göre yaklaşık %0,1 – 10 arasında yer almaktadır ancak silisyumun hangi formlarının biyolojik olarak bitki tarafından absorbe edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Silisik asit polimerizasyonu olan polisilisik asit biyolojik olarak alınabilir formda değildir.

Silisik asidin, monosilisilik asit Si(OH)_4 veya ortosilisik asit (OSA) formları bitki tarafından alınabilir tek formudur.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

KULLANILDIĞI YERLER	UYGULAMA DOZU
Nar	100 ml / 100 l su
Kiraz	100 ml / 100 l su
Kayısı	100 ml / 100 l su
Elma	100 ml / 100 l su
Armut	100 ml / 100 l su
Sebze	100 ml / 100 l su
Çilek	100 ml / 100 l su
Zeytin	100 ml / 100 l su
Truğgil	100 ml / 100 l su
Antep Fıstığı	100 ml / 100 l su
Kesme Çiçek	100 ml / 100 l su
Bağ	100 ml / 100 l su
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Turp, Havuç,	100 ml / 100 l su
Sera ve Örtü Altı Sebzeler	100 ml / 100 l su

