

COPOROO

SUSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP

M1

FUNGUSİT MANTAR İLACI

FAYDALARI

- Yüksek formülasyon teknolojisi
- Kaliteli bakır içeriği
- Küçük ve ince partikül çapı
- Yağmura dayanıklılık
- Çok yer engelleyici / Multisite etki
- Düşük dayanıklılık riski
- Üründe leke bırakmaması
- Yüksek ve güvenilir kalıntı / MRL değerleri

65.82 g/L

Metalik bakıra eşdeğer Bakır Sülfat

NOVICHEM
Plant Extracts

bel
cert

GMP
(GOOD MANUFACTURING PRACTICES)
ISO 22716:2013

QMS
(QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)
ISO 9001:2015

COPOROO

SUSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP M1 FUNGUSİT MANTAR İLACI

COPOROO® üstün formülasyon teknolojisi ile geliştirilmiş, yüksek kaliteli bakır sülfat içeren yeni ve eşsiz bir fungusittir.


Litresinde 65.82 g metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat içerir.

COPOROO® fungal hücrede hastalık sporlarının çimlenmesini engelleyerek bir çok fungal hastalığa karşı etkilidir.

COPOROO® çok küçük molekül çaplı bakır iyonları içerir.

Böylelikle yaprak yüzeyinde ve toprakta daha iyi bir şekilde kaplama yapar.

Biyolojik etkinliği yüksek olduğu için minimum miktarda ilaç ile maximum etki ve fayda sağlar.



Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Sonilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
ARMUT	Karaleke (Venturia Pirina)	125 ml / 100 L su	21 Gün
*BAĞ	Mildiyö (Plasmopara Viticola)	50 ml / 100 L su	21 Gün
DOMATES (Tarla)	Mildiyö (Phytophthora infestans)	100 L su Dekara** 150 ml / 100 L su 75 ml / da**	14 Gün
DOMATES (Sera)	Mildiyö (Phytophthora infestans)	100 L su Dekara** 150 ml / 100 L su 75 ml / da**	14 Gün
ELMA	Karaleke (Venturia inaequalis)	150 ml / 100 L su	21 Gün
HIYAR	Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospara Cubensis)	100 ml / 100 L su	14 Gün
KAYISI	Yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophylus = stigmia carpophila)	125 ml / 100 L su	21 Gün
KIRAZ	Çiçek Manolyası (Monilina Laxa)	125 ml / 100 L su	21 Gün
KORNIŞON	Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospara Cubensis)	100 ml / 100 L su	14 Gün
NAR	Narda Kahverengi Leke (Alternaria alternata)	125 ml / 100 L su	21 Gün
TURUNÇGİLLER	Kahverengi Leke (Alternaria alternata f.sp citri)	250 ml / 100 L su	21 Gün
ZEYTİN	Halkalı Leke (Spilocaea oleagina = Cyclogoinum oleaginum)	125 ml / 100 L su	21 Gün

COPOROO
PATOJENİ
TÜM EVRELERİNDE
ÖLDÜRÜR.